

blement pour y déposer ses œufs, qui tombent à terre avec le moût desséché et d'où les larves sortent pour se nourrir aux dépens des racines de quelques plantes qui poussent dans les vignes, car on ne les a jamais signalées comme s'attaquant aux racines des vignes elles-mêmes. Quant aux procédés à employer pour combattre ces coupe-bourgeons, je conviens avec mon ami de Manuel, que de fréquents labourages, surtout à la fin de l'hiver, gêneraient considérablement les larves et les nymphes de *Otiiorhynchus*.

Du reste, une autre espèce du même genre, l'*O. raucus*, a été signalée par Lefebvre, le fondateur de notre Société, comme attaquant les vignes de son jardin à Passy.

M. le D<sup>r</sup> Sénac, à la suite de cette communication, fait remarquer que, dans le département de l'Allier, l'*Otiiorhynchus lugdunensis* se trouve en abondance tous les deux ou trois ans et qu'il fait de grands ravages en détruisant les bourgeons des jeunes arbres à fruits.

— M. Ernest André, de Gray, adresse les descriptions de trois nouvelles espèces de Fourmis :

1. *PONERA ABEILLEI* André, nov. sp. — Tête en rectangle allongé, une fois et demie aussi longue que large, ses bords latéraux droits, son bord postérieur non échancré; mandibules lisses, distinctement denticulées tout le long du bord apical. Pas d'yeux. Thorax bas, plan en dessus, sans suture distincte entre le mésonotum et le métanotum; écaille épaisse, à peine amincie en dessus. Entièrement d'un jaune rougeâtre, avec les pattes et les antennes plus claires. Abdomen assez fortement pubescent, surtout en arrière, le reste du corps avec une pubescence très fine et peu visible. Luisant, presque lisse; ponctuation de la tête et du thorax extrêmement fine et peu serrée. — Long. 2 1/4 mill.

Cette espèce, qui provient d'Ajaccio, m'a été donnée par M. Abeille de Perrin. Elle se distingue facilement de la *P. ochracea* Mayr, dont elle a la couleur, par sa taille plus petite, son écaille plus épaisse, ses tergites presque lisses, sa pubescence beaucoup plus rare et son thorax sans suture visible en dessus entre le mésonotum et le métanotum.

2. *APHENOGASTER BLANCI* André, nov. sp. — Tête carrée, pas plus longue que large, assez régulièrement et longitudinalement striée, la