Bull.

1894

SOCIETÀ ENTOMOLOGICA ITALIANA

Bull. Soc. Ent. Ital., (resoconto) 26:
7-11.

E S T R A T T O

dal Resoconto dell'Adunanza ordinaria del 25 Marzo 1894

ALCUNE FORMICHE DELL'ISOLA DI CRETA

pel Prof. C. EMERY 1894

Le Formiche che sono oggetto di questa nota furono raccolte nell'estate scorsa dal Dott. Giacomo Cecconi, durante un viaggio scientifico fatto insieme ai dottori Vittorio Simonelli e Antonio Baldacci. — Secondo l'elenco pubblicato da Forel, il v. Oertzen aveva raccolto in Creta 20 specie e sottospecie di Formiche. Il Cecconi ne ha raccolte 18; di queste, due non erano state finora rinvenute in quell'isola e l'una di esse è affatto nuova. Tre altre forme mi sembrano meritare di essere distinte come varietà con nomi proprî. — È particolarmente notevole l'assenza dei generi *Formica* e *Myrmica* nella fauna cretese.

Meritano speciale menzione le forme seguenti:

Aphaenogaster (Ischnomyrmex) Cecconii n. sp.

♀ *Nigra, nitida, mandibulis, antennis, trochanteribus, femorum basi, geniculis, tarsi et abdominis segmenti 3. basi rufescentibus; breviter pilosa, parcissime pubescens, scapis tibiisque pube obliqua. Caput postice conice angustatum, margine occipitali dilatato, acuto, fronte medio elevata, linea subtili impressa, vertice cum impressione longitudinali, genis, fronte et verticis parte anteriore opacis, crebre punctatis, parte posteriore colloque nitidis, vix obsolete punctatis, foveis antennalibus striatis, genis nitidulis, clypeo depresso, medio submarginato, irregulariter rugoso, mandibulis striatis, 8-dentatis, antennis gracilibus, flagelli articulis 1. et 2. subaequilongis, 4 ultimis clavam indistinctam efficientibus. Thorax*