

ликом по з. краю. У ♀ 4й—5й сегм. с длинными коричневатыми волосками по з. краю.

P. fuscipennis Dahl

2 (1). Тёмя и лоб блестящие и пунктированные. Полукруглого углубления на осн. 2го сегм. нет или оно совсем не ограничено позади. У ♂ 4й—5й сегм. с короткими волосками по з. краю. Лицо и нал. с густым серебристо-белым опушением; последний на конце с 2 зубчиками.

P. atratus Rambur

25. MIMESA Shuck. 1 (2). Бр. совсем чёрное, стебелек с небороздчатым килем вдоль середины. Пигидиальное поле ♀ широко треугольное не блестящее, грубо пунктированное. Редко.

M. unicolor Westw.

2 (1). Брюшко частью красное.

3 (4). Стебелек бр. с бороздками вдоль срединного киля. Мезоплевры гладкие. Згр. очень грубо морщинистая. Редко.

M. bicolor Westw.

4 (3). Стебелек бр. сверху почти плоский, без прод. киля. Мезоплевры густо пунктированы. Згр. не грубо морщинистая.

M. equestris Westw.

26. TRYPOXYLON Latr. 1 (4). П. ноги чёрные. Ус. не сильно булавовидные, у ♂ последний член явственно загнут.

2 (3). 1й сегм. бр. короче 2 след. вместе. Расстояние между глазами на нал. и на темени прибл. одинаково. 6—12 мм (р. 178 С).

T. figulus L.

3 (2). 1й сегм. бр. по длине равен 2 следующим вместе и очень тонкий. Расстояние между глазами на нал. значительно меньше, чем на темени. 6—10 мм.

T. attenuatum Smith

4 (1). П. голени с ц. стороны и ц. лапки глинисто-жёлтые. Ус. короткие и сильно булавовидные. Мелкие виды. Расстояние между глазами на наличнике вдвое меньше, чем на темени. У ♀ 3й, 4й и 5й членники жгутика ус. значительно длиннее, чем их ширина на конце. 5—10 мм.

T. clavicornis Lep. et Serv.

26 сем. Formicidae. — Муравьи

Общественные стебельчатобрюхие перепончатокрылые сколенчательки, кроме самцов и самок имеются бесплодные бескрылые санки — рабочие, с небороздчатой грудью.

Тело муравья (р. 179А) распадается на обычные для насекомых части. Усики сколенчательные, 1й их членник образует рукоять (р. 179 А — Р), остальные членники образуют эпигастрик (Ж). Между среднеспинкой и заднеспинкой имеется потертое вдавление (В). На заднегрудке (ЗГР'), точнее — заднеспинке, отличается основная (верхняя — ОП) и покатая (задняя — ПП) поверхность, между ними помещаются аубчики или шипчики (Ш), 1 или 2 передние членники брюшка образуют стебелек (С1 и С2).

На голове (р. 179 В) имеются глазки (оселли); лобные валики, идущие по бокам средней линии головы в виде 2х продольных киелей (ЛВ), между ними — углубленная линия — лобная бороздка (ЛБ). Передняя часть головы занята лицевым щитком (ЛЩ), в верхней части которого обособлено треугольное поле — лобная площадка (ЛП). На жалах отличается ровный наружный край — Н и заэбуренный — внутренний или оксевателльный — Ж.

Из прочих признаков имеет значение форма членников стебелька: если верхняя часть членника приподнята в виде бугорка, то этот бугорок называется усиковым, если бугорок особенно высок и уплощен, он называется чешуйкой. Брюшко оканчивается отверстием клюзажи, которое или находится на самом конце, вытянуто в маленькую трубочку и окружено венчиком волосков, или свинчено вниз и имеет вид неперечной щели. На голове (р. 179 Е) в месте прикрепления усииков имеется углубление.